Блокировка повторного назначения анализа при положительном результате

В настройках параметра анализа имеется возможность установить блокировку повторного назначения исследования, в котором находится параметр, на определённый период времени.

Базовая настройка анализа и параметров исследования описана в этой инструкции.




Рисунок 1 — Настройка блокировки назначения в параметре исследования

1) Диагноз по МКБ — диагноз пациента при котором данная настройка будет отрабатывать
2) Длительность блокировки — продолжительность выбранного действия при попытке назначить повторное исследование (в днях)
3) Действие:
 1. Блокировать — запрет повторного назначения исследования в промежутке длительности

блокировки
2. Информировать — предупреждение о том, что назначение является повторным

Настройка применится к повторным назначениям, если у настроенного параметра будет обнаружен положительный результат и диагноз пациента соответствует установленному в первом (1) пункте диагнозу.. В таком случае к исследованию (не анализу), в котором находится параметр, будет применена блокировка.




Рисунок 2 — Результат исследования с положительным значением настроенного параметра




Рисунок 3 — Запрет

назначения из-за отработавшей настройки




Рисунок 4 — Запрет в мастере назначения анализов




Рисунок 5 —

Сообщение информирования

Revision #9
Created 4 March 2025 08:11:51 by Алексеев А.С.
Updated 18 September 2025 07:56:39 by Коломейцев Антон

1 4